## 【禁忌・副作用条項】

以下の【禁忌事項】と【慎重検討とする事項】に当てはまる場合はセレック V(cellec V)による美容治療を受けられません。必ずお読みいただき、一つでも当てはまる条件がないか必ず確認して下さい。

- 美容治療をお受けいただけない患者様について【禁忌事項】
  - ◆ 心臓ペースメーカー等埋め込み型医療機器をご使用の方
  - ◆ 心臓疾患の方
  - ◆ 出血性疾患の方
  - ◆ 自己免疫疾患の方
  - ◆ 光過敏性疾患の方
  - ◆ 光感作性薬剤を服用している方
  - ◆ 糖尿病による合併症を発症している方
  - ◆ 皮膚悪性腫瘍、前癌病変、またはその疑いがある方
  - ◆ 美容治療部位に創傷、重篤な皮膚疾患および感染症がある方
  - ◆ 美容治療部位に金の糸または金属プレート等を入れている方
  - ◆ 美容治療部位にタトゥー、アートメイクのある方
  - 創傷治癒に影響を与える可能性のある一般的または局所的な皮膚疾患を有する患者
  - ◆ 金製剤を服用したことがある方
  - ◆ ケロイドを有する部位への美容治療およびケロイド体質の方
  - ◆ てんかんの方
  - ◆ アルコール依存症、薬物依存症などの精神神経疾患の方
  - ◆ 妊娠している方
  - ◆ 乳幼児
  - ◆ 患者が非現実的な過度の期待をしている場合
- 美容治療を受ける場合に、事前に慎重な検討をしなければならない患者様について

## 【医師の指導が必要とする場合】

- ◆ 悪性疾患の方
- ◆ 高血圧症の方
- ◆ 急性疾患の方
- ◆ 敏感肌の方
- ◆ 多毛症の方
- ♦ 局所麻酔に対する皮膚アレルギーがある方
- ◆ 治療後に使用する薬剤に対してアレルギーがある方
- ◆ 抗血液凝固剤を服用している方
- ◆ 抗炎症薬、アスピリンを服用している方
- ◆ ビタミン A 誘導体(トレチノイン)を使用している方
- ♦ 日焼けをしている方、もしくは治療後に日焼けをする可能性がある方
- ◆ 授乳中の方
- ◆ アルコール中毒及び薬物中毒の方

- 起こりうる【副作用】について
  - ♦ 痛み
  - ◆ 皮膚の損傷
  - ◆ 色素沈着
  - ♦ 傷跡
  - ◆ 過度の浮腫
  - ◆ 紅斑・紫斑

## 美容治療前後の注意事項

- ◆ 少なくとも1週間は角質除去をせず、スクラブを使用しないでください。
- ◆ 少なくとも 48 時間は機能性化粧品 (例: レチノール、AHA) の使用を控えてください。
- ◆ 少なくとも1週間程度はサウナに入らないでください。
- ◆ アルコール成分が含まれているスキンローションは美容治療後に皮膚に刺激を与えかねないので避け、 水分のみのスキンローションをご使用ください。
- ◆ 美容治療後、日焼けに留意しないと色素沈着を起こしかねませんので、毎日日焼け止め剤(SPF 30 以上、PA++)を塗ることを習慣とし、長時間外にいる場合は大きなつばのついた帽子や傘を使用し、厚めに化粧してください。少なくとも30日は継続してください。
- ◆ 他の疾病のため薬を使う場合は医師にご相談ください。